

# Sulfar

**Antioidico a base di proteinato di Zolfo in sospensione concentrata, ad azione complementare contro ticchiolatura, ruggine, corineo, acari ed eriofidi**

## COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da Selenio) g 45 ( 607 g/l)  
Supporto proteico vegetale ed inerti q.b a g 100  
Titolare della registrazione: Serbios S.r.l. Via Enrico Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO)  
Tel. 0425/590622

Autorizzazione n° 11196 del 05.02.2002 del Ministero della Salute.

Officine di produzione:

Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)

Diachem S.p.A. - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)

**Contenuto: Kg 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25**

Partita n°: . . .

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso; P302+P352: in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso in questa etichetta); P332+P313: In caso di irritazione della pelle, consultare un medico; P362: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente;

## INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



**Attenzione**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE:** Sulfar è un particolare formulato a base di proteinato di zolfo ad azione antioidica per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono le colture. Sulfar inoltre esercita una azione collaterale nei confronti di altre crittogame (Ticchiolatura delle Pomacee, Ruggine, Corineo) degli acari in genere (Ragnetto rosso) e degli Eriofidi.

Le sue favorevoli caratteristiche presentano i seguenti vantaggi: elevata selettività nei confronti delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia; la sostanza proteica vegetale permette una favorevole ripresa vegetativa della coltura trattata

**Epoche, dosi e modalità di impiego (riferite a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volumi normali)**

### Vite:

- trattamenti contro Oidio, Eriofidi  
➤ primaverili-estivi: 250-350 g/hl

### Pomacee:

- trattamenti contro Oidio, Ticchiolatura, Eriofide del Pero  
➤ in Prefioritura: 350-500 g/hl  
➤ in Post-fioritura: 250-300 g/hl

### Drupacee:

- trattamenti contro Oidio  
➤ Primaverili estivi: 250-400 g/hl  
• **Pesco** (contro Acariosi):  
➤ Pre-apertura gemme: 250-400 g/hl  
• **Susino** (contro Ruggine):  
➤ In estate: 200 g/hl nelle ore più fresche

### Agrumi:

- trattamenti contro Oidio  
➤ Alla comparsa dei primi sintomi: 250-400 g/hl

### Nocciolo, Mandorlo:

- trattamenti contro Mal Bianco  
➤ Da fine estate e in autunno: 250-400 g/hl  
• **Nocciolo** (Eriofide)  
➤ Inizio primavera: 250-400 g/hl

### Olivo:

- trattamenti contro Oidio  
➤ Alla comparsa dei primi sintomi: 300-400 g/hl

### Ortaggi: (escluso funghi):

- trattamenti contro Mal Bianco  
➤ Primaverili-estivi: 250-400 g/hl  
• **Pomodoro:** (Acaro Rugginoso)  
➤ alla comparsa dei primi acari: 250-400 g/hl

### Patata: trattamenti contro Oidio

➤ Ai primi sintomi: 250-400 g/hl

### Fragola: trattamenti contro Oidio

➤ Preventivamente o ai primi sintomi 250-350 g/hl

### Barbabietola da Zucchero, Cereali, Soia, Girasole: contro Oidio

➤ Alla comparsa dei primi sintomi: 3-5 kg/ha

### Tabacco: trattamenti contro Oidio

➤ Preventivamente o ai primi sintomi 250-350 g/hl

### Floreali e ornamentali: trattamenti contro Oidio

➤ Preventivamente o ai primi sintomi 200-300 g/hl

➤ Su rosa fino allo stadio di bottone verde: 200-300 g/hl

### Forestali: trattamenti contro Oidio

➤ Alla comparsa dei primi sintomi: 200-350 g/hl

### Vivai di Pioppo: trattamenti contro Oidio

➤ Alla comparsa dei primi sintomi: 200-350 g/hl

**COMPATIBILITA':** il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali, con Captano, Diclofluanide.

**AVVERTENZE:** Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente nelle prime ore del mattino o con cielo coperto. Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di **Mele:** Black Ben Devis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Styman Red Winesap. **Pere:** Buona luigia d'Avranches, contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico.

## Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Attenzione:** mescolare bene il prodotto prima dell'impiego.

Conservare il prodotto nel contenitore originale, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo.

**Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non venderli sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

# Sulfar

**Antiodico a base di proteinato di Zolfo in sospensione concentrata, ad azione complementare contro ticchiolatura, ruggine, corineo, acari ed eriofidi**

## COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da Selenio) g 45 ( 607 g/l)  
Supporto proteico vegetale ed inerti q.b a g 100

Titolare della registrazione:

Serbios S.r.l. Via Enrico Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO)  
Tel. 0425/590622

Autorizzazione n° 11196 del 05.02.2002 del Ministero della Salute.

Officine di produzione:

Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI)

Diachem S.p.A. - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)

Contenuto: Kg 0,1

Partita n°: . .



**Attenzione**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea

## CONSIGLI DI PRUDENZA

**P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso; P302+P352: in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P321: Trattamento specifico (vedere indicazioni supplementari di pronto soccorso in questa etichetta); P332+P313: In caso di irritazione della pelle, consultare un medico; P362: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente;**

## INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

**EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**