

OLEOTER PLUS

INSETTICIDA ED ACARICIDA (CONCENTRATO EMULSIONABILE)

OLEOTER PLUS

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale paraffinico (N. CAS 8042-47-5) g 97 (= 830 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di Pericolo

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza P261 Evitare di respirare gli aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Titolare dell'autorizzazione: LERIDA UNION QUIMICA S.A., C./Afores s/n, 25173 Sudanel Lleid (Spagna)
Tel. [0034] 973 25 82 56

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Officine di produzione e/o confezionamento: LERIDA UNION QUIMICA S.A., C./Afores s/n, 25173 Sudanel Lleid (Spagna)

Stabilimento di rietchettatura: ARCO Logistica Srl – Ferrara (FE); CDM Srl - Cimadolmo (TV); Logikem S.r.l. – Ravenna (RA).

Registrazione del Ministero della Salute N. 19386 del 07/08/2026

Contenuto netto: 100, 250, 500 mL / 1,5,10, 20, 25 L

Partita N...



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Protezione dell'operatore:

- durante miscelazione/caricamento del prodotto: indossare indumenti da lavoro e guanti.
- durante l'applicazione, se effettuata manualmente indossare indumenti da lavoro e guanti; se effettuata mediante trattore, indossare indumenti da lavoro.
- durante le attività di rientro in campo, indossare indumenti idonei a coprire gli arti superiori e inferiori.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

- 15 m per applicazioni su mandorlo, drupacee, pomacee, nocciolo, cachi, castagno, melograno, kiwi, mango, noce e noce pecan.
- 20 m per applicazioni su agrumi, avocado e kumquat.
- 30 m per applicazioni su banano.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, per l'uso su banano, rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zone non coltivate pari a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.
Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi fogliari siano completamente asciutti.

CARATTERISTICHE

OLEOTER PLUS è un insetticida di contatto a base di olio minerale paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce la respirazione causando quindi la morte per asfissia del fitofago.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Drupacee, Pomacee, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Noce pecan, Castagno, Cachi, Kiwi, Melograno, Mango

Contro Acari, Cocciniglie farinose (*Pseudococcidae*), Cocciniglie (*Coccidae*), Afidi (*Aphididae*): 0,75-1 L/hl (6-15 L/ha) distribuiti con volume massimo di irrorazione di 1500 L/ha. Effettuare un solo trattamento per anno, all'insorgenza delle prime infestazioni parassitarie, fino alla fioritura.

Agrumi, Kumquat e Avocado

Contro Cocciniglie farinose (*Pseudococcidae*), Cocciniglie (*Coccidae*), Afidi (*Aphididae*), Mosche Bianche (*Aleyrodidae*): 1-1,5 L/hl (20-45 L/ha) con volume massimo di irrorazione di 3000 L/ha. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno all'insorgenza delle prime infestazioni parassitarie, prima della fase di invaiatura. Rispettare tra i trattamenti un intervallo di almeno 10 giorni.

Banano

Contro Cocciniglie farinose (*Pseudococcidae*), Cocciniglie (*Coccidae*), Afidi (*Aphididae*), Mosche Bianche (*Aleyrodidae*): 1-1,5 L/hl (15-45 L/ha) distribuiti con volume massimo di irrorazione di 3000 L/ha. Effettuare massimo un solo trattamento/anno all'insorgenza delle prime infestazioni parassitarie, lungo l'intero ciclo vegetativo.

Le dosi sopra riportate espresse in L/hL si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione. In caso di Volumi Ridotti, fare riferimento alla dose ad ettaro. Per massimizzare l'attività del formulato, impiegare volumi di irrorazione adeguati a garantire una sufficiente bagnatura delle piante trattate. In ogni caso, al fine di ottenere un'adeguata efficacia del trattamento, verificare che l'applicazione consenta la completa ricopertura degli insetti ed acari bersaglio.

Preparazione della miscela: versare il prodotto nel serbatoio già riempito per 3/4 di acqua, mantenendo la pompa in costante agitazione, quindi portare l'acqua al volume totale. Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con fungicidi quali captano, folpet o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Si possono avere rischi di fitotossicità in caso di trattamenti durante periodi prolungati con temperature elevate. Non trattare piante sotto stress idrico.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente -