

# FANDANGO® 360 TF

ERBICIDA SISTEMICO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI E PERENNI  
SOLUZIONE CONCENTRATA

Meccanismo d'azione: Gruppo G (HRAC)

FANDANGO® 360 TF

## COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro 30,8 g (=360 g/L)  
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)  
Coformulanti q.b. a 100 g

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

## INDICAZIONI DI PERICOLO:

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

## CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Titolare dell'autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

## Stabilimento di produzione e confezionamento:

Bayer Agriculture BV – Anversa (Belgio)

## Stabilimento di confezionamento:

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 16830 del 22/12/2016**

**Taglie:** 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 – 60 – 120 – 200\* – 640\* – 1000\* L

**Partita n.:**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

Divieto ai fini della protezione delle acque sotterranee dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%, aree vulnerabili e zone di rispetto di cui all'art 93, comma 1 e all'art 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zone non coltivate o, in alternativa, impiegare misure che riducono la deriva del:

- 50% per applicazioni a bande lungo o tra le fila (1 x 10 L prodotto per ettaro)
- 50% per applicazioni su tutta la superficie (4 L + 6 L, 2 x 5 L oppure 1 x 6 L prodotto per ettaro)
- 75% per applicazioni su tutta la superficie (1 x 10 L prodotto per ettaro).

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Su argini e fossi il prodotto deve essere impiegato a non meno di 30 giorni dall'immissione dell'acqua.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni**

## CARATTERISTICHE

**FANDANGO 360 TF** è un erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo di specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni).

Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi ipogei; non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

## MODALITÀ DI IMPIEGO:

Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio tradizionali o antideriva o ad induzione d'aria. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante, l'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura.

Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

Si raccomanda di non trattare in caso di rischio di pioggia imminente. Impiegare un volume d'acqua di 200 - 400 L/ha per le colture arboree, le orticole, barbabietola da zucchero, mais, soia, terreni agrari in assenza di coltura, e di 250-400 L/ha per rose, vivai, aree non destinate alle colture agrarie.

Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.

L'efficacia può essere ridotta dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Da non impiegare in pre-raccolto.

## CAMPI DI IMPIEGO

- **ARBOREE (AGRUMI, DRUPACEE, OLIVO DA OLIO E DA TAVOLA, MELO, PERO, VITE DA VINO E DA TAVOLA, NOCE, NOCCIOLO, MANDORLO)**

Effettuare un massimo di 3 applicazioni l'anno in bande lungo la fila, evitando il contatto con foglie e parti del fusto non lignificate, senza eccedere la dose massima di 10 L/ha. Per il diserbo dell'olivo da olio non superare la dose massima di 6 L/ha.

- **ORTICOLE (CARCIOFO, CAROTA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, MELANZANA, POMODORO, PATATA)**

Effettuare un massimo di 2 applicazioni l'anno senza eccedere la dose massima di 10 L/ha per applicazioni in banda tra le file della coltura già insediata impiegando esclusivamente apposite attrezzature selettive o schermanti per evitare il contatto con la coltura.

- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, MAIS, SOIA**

Effettuare un massimo di 2 applicazioni l'anno senza eccedere la dose massima di 10 L/ha per applicazioni in banda tra le file della coltura già insediata impiegando esclusivamente apposite attrezzature selettive o schermanti per evitare il contatto con la coltura.

**- TERRENI AGRARI IN ASSENZA DI COLTURA (BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, FRAGOLA, MAIS, ORTICOLE, SOIA)**

Prima della lavorazione del terreno o della messa a dimora (presemina, pre-trapianto) delle colture riportate in parentesi, ovvero in seguito alla raccolta della coltura in precessione colturale, è possibile effettuare un trattamento con FANDANGO 360 TF senza eccedere la dose massima di 6 L/ha.

Prima della semina o del trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura) trattare con le infestanti emerse. Dopo solo 6 ore dal trattamento si può già effettuare la semina.

Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Le lavorazioni del terreno sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali ed a partire da 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci.

**- ROSE, VIVAI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI, PIOPPI**

Effettuare un massimo di 2 applicazioni l'anno senza eccedere la dose massima di 10 L/ha. È possibile intervenire: in modo localizzato impiegando esclusivamente apposite attrezzature selettive o schermanti per evitare il contatto con le piante; sull'intera superficie dell'appezzamento prima della lavorazione del terreno o della messa a dimora (pre-semina, pre-trapianto) delle piante, ovvero in seguito alla raccolta delle piante in precessione.

**- AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE**

Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (ad esclusione delle aree di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2012 quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta. Effettuare al massimo 2 applicazioni l'anno senza eccedere la dose massima di 10 L/ha.

**DOSI DI IMPIEGO:**

**Per tutti gli usi consentiti non superare la dose massima di 10 L/ha/anno di prodotto.**

**Per il diserbo dell'olivo da olio non superare la dose massima di 6 L/ha.**

In funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata:

**Infestanti annuali e biennali:**

**1 - 3 L/ha:** *Alopecurus* sp. (Coda di volpe), *Avena* sp. (Avena), *Lolium* sp. (Loglietto), *Mercurialis* sp. (Mercorella), *Poa* sp. (Fienarola), *Oryza sativa* var. *silvatica* (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus* sp. (Amaranto), *Calendula* sp. (Calendula), *Chenopodium* sp. (Farinaccio), *Orobancha* (Succhiamela), *Portulaca* sp. (Porcellana comune), *Raphanus* sp. (Rafano), *Senecio* sp. (Senecio), *Sinapis* sp. (Senape), *Stellaria* sp. (Centocchio), *Veronica* sp. (Veronica)

**Infestanti vivaci e perenni:**

**3,5 - 4,5 L/ha:** *Agropyron repens* (Gramaccia), *Carex* sp. (Carice), *Cirsium* sp. (Cardo campestre), *Euphorbia* sp. (Euforbia), *Glyceria* sp. (Gramignone), *Hypericum* sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), *Phalaris* sp. (Falaride), *Rumex* sp. (Romice), *Sonchus* sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

**5 - 6 L/ha:** *Alisma* sp. (Piantaggine d'acqua), *Asphodelus* sp. (Asfodelo), *Butomus* sp. (Giunco fiorito), *Cyperus* sp. (Cipollino), *Ferula* sp. (Ferula), *Juncus* sp. (Giunco), *Nardus* sp. (Nardo), *Scirpus* sp. (Scirpo), *Sparganium* sp. (Coltellaccio), *Tussilago* sp. (Tossilagine).

**7 - 9 L/ha:** *Agrostis* sp. (Capellini dei campi), *Alium* sp. (Aglio selvatico), *Artemisia* sp. (Assenzio selvatico), *Arundo* sp. (Canna selvatica), *Cynodon* sp. (Gramigna), *Eragrostis* sp. (Panaceo), *Glechoma* sp. (Ellera), *Oxalis* sp. (Ossalide), *Paspalum* sp., *Phragmites* sp. (Cannuccia), *Pteridium* sp. (Felce), *Ranunculus* sp. (Ranuncolo), *Rubus* sp. (Rovo), *Tipha* sp. (Tifa), *Urtica* sp. (Ortica).

**10 L/ha:** *Aristolochia* sp. (Aristolachia), *Clematis* sp. (Clematide), *Convolvulus* sp. (Vilucchio), *Rubia peregrina* (Robbia).

**Infestanti arboree ed arbustive:**

**4 - 6 L/ha:** *Acer* sp. (Aceri), *Fraxinus* sp. (Frassino), *Genista* sp. (Ginestra), *Salix* sp. (Salice), *Sambucus* sp. (Sambuco), *Vaccinium* sp. (Mirtillo)

**10 L/ha:** *Calluna* sp. (Brugo), *Cistus* sp. (Cisto), *Erica* sp. (Erica), *Lonicera* sp. (Caprifoglio)

**GESTIONE DELLE RESISTENZE**

Per prevenire la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in miscela o in programmi di diserbo che includano l'uso di prodotti a differente meccanismo d'azione, metodi agronomici, meccanici o fisici.

**FITOTOSSICITÀ:** il prodotto non è selettivo. il prodotto può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare attrezzature schermate o selettive. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 L/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto.

Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Conservare il prodotto in ambienti in cui la temperatura impedisca al prodotto di essere esposto al gelo.

**Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

\* **ATTENZIONE:** Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.