THIOVIT®

Fungicida in microgranuli idrodisperdibili a base di zolfo micronizzato per impiego contro gli oidii in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura, cereali e barbabietola da zucchero
Zolfo – Codice FRAC: M02

Composizione
100 g di prodotto contengono:
zolfo puro (esente da selenio) g 80
coformulanti q.b.a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 11339 del 22.05.2002

Stabilimenti di produzione:
QUIMETAL Industrial S.A. - Santiago (Chile)
SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., Saint Pierre (Francia)
CEREXAGRI - Le Canet, Marseille (Francia)
Isagro S.p.A., Aprilia (LT)
Stabilimenti di rietichettatura:
ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) – Italia
Sinteco Logistics S.p.A.. S.Giuliano Milanese (MI) - Italia
Partita n. vedi corpo della confezione
Contenuto netto: kg 1-5-10–20-25
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
THIOVIT è una formulazione tecnologicamente avanzata ottenuta per micronizzazione frazionata. Grazie alle particelle (microbilie) di dimensioni ottimali caratterizzate da elevata omogeneità, THIOVIT consente allo zolfo di estrinsecare tutte le sue caratteristiche.
La particolare formulazione, caratterizzata da assenza di polvere, rapida disperdibilità in acqua e superiore miscibilità facilita la preparazione della poltiglia.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi (kg/hl)*	Dosi (kg/ha)	Applicazione
Vite (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe necator)*	0,2 – 0,4	2 - 4	Medio-bassa pressione della malattia. Massimo 10 applicazioni.
		0,6 – 0,8	6 - 8	Alta pressione della malattia. Massimo 10 applicazioni.
Pomacee (pieno campo)	Oidio *(Podosphaera leucotricha)*	0,6	6 - 9	Massimo 14 trattamenti in pre-fioritura
		0,2 – 0,3	3 - 4,5	Massimo 14 trattamenti in post-fioritura
Drupacee (pieno campo)	Oidio *(Sphaerotheca pannosa)*	0,2 – 0,6	3 - 9	Utilizzare la dose più elevata in pre-fioritura e dopo la raccolta. Massimo 6 applicazioni ad intervalli di 1-14 giorni
Nocciolo (pieno campo)	Oidio *(Phytoptus avellanae Phyllactinia guttata Phyllactinia suffulta)*	0,2 – 0,5	3 – 7,5	Massimo 14 trattamenti dalla prima foglia distesa a intervalli di 10-12 giorni
Barbabietola da zucchero (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe betae)*	2	8	Massimo 2 applicazioni ad un intervallo di 20 giorni
Cereali (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe graminis)*	2	8	Trattare alla comparsa della malattia sulla penultima foglia
Ortaggi (pieno campo e serra)	Oidio *(Oidium spp)*	0,15 – 0,5	1,5 - 5	Massimo 6 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni
Fragola (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca macularis)*	0,2 – 0,5	2 - 5	
Floricole e Ornamentali (pieno campo e serra)	Oidio *(Oidium spp)*	0,15 – 0,5	1,5 - 5	

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 l/ha per pomacee, drupacee, e nocciolo; 1000 l/ha per vite, ortaggi, fragola e ornamentali; 400 l/ha per cereali e barbabietola da zucchero.

Adattare quantitativi d'acqua adeguati per una completa e omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Con temperature molto elevate alle dosi più alte, il prodotto può risultare fitotossico. Per proteggere le piante non bersaglio, non applicare il prodotto quando le temperature superano i 30°C. Se ne consiglia pertanto l'impiego nelle ore più fresche della giornata.

Fitotossicità
Può arrecare danno alla cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
Su floricole/ornamentali, in considerazione della rapida evoluzione varietale, si consiglia di eseguire saggi su piccole superfici prima di estendere il trattamento a pieno campo.

Compatibilità
THIOVIT non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali. Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali.

Nella preparazione di miscele estemporanee, preparare prima la poltiglia con THIOVIT, quindi aggiungere gli altri formulati poco prima di irrorare la miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 2.01.2023

syngenta

Preparazione della poltiglia
Versare THIOVIT direttamente nel serbatoio dell'atomizzatore riempito per 2/3 d'acqua mantenendo in funzione l'agitatore. Portare quindi a volume

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 2.01.2023

syngenta