

# CUTRIL TOP

Fungicida a base di Rame sotto forma di rame solfato tribasico

Sospensione concentrata

Gruppo FRAC: M01 Fungicida multisito con attività di contatto



## COMPOSIZIONE

- Rame metallo g. 15,2 (= 190 g/l)  
(sotto forma di rame solfato tribasico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

## ATTENZIONE

**Indicazioni di pericolo:** H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**Consigli di Prudenza:** P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. P391 raccogliere il materiale fuoruscito. P501 smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle normative vigenti.

**Informazioni supplementari:** EUH401 per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Registrazione n. 12395 Ministero della Salute 12/11/2007

### Titolare dell'autorizzazione:

GOWAN ITALIA S.r.l. – Via della Costituzione nr. 8 – 48018 Faenza (RA) - Tel. + 39 0546 629911

### Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

Isagro Spa - Località Colafonda 5 - 45010 Cavanella Po – Adria (RO)

### Stabilimenti di solo confezionamento:

Isagro S.p.A. – Via Nettunense Km 23,400 – 04011 Aprilia (Latina)

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. – Via E. Torricelli nr. 2 – 48033 Cotignola (RA)

Diachem S.p.A. – U.P. SIFA Caravaggio – (BG)

### Stabilimento di rietichettatura:

Arco Logistica S.r.l. Via Battistella, 22 44123 Ferrara

Arco Logistica S.r.l. Via Monari, 5 - 44124 Ferrara

### Distribuito da:

SERBIOS s.r.l. – Via E. Fermi nr. 112 - Badia Polesine (RO) – Tel.: 0425 590622

Contenuto netto: ml 100, 150, 200, 250, 500; Litri 1,5,10, 20

Partita n.:

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- 10 m per ortaggi, pomodoro, vite (applicazione al verde), patata;
- 20 m per agrumi e olivo;
- 10 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per kiwi;
- 20 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per nocciolo, noce, ornamentali, piccoli frutti, cipresso;
- 20 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee/drupacee.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi.

Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovenosa e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

**Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni.

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

*“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.*

Coltura	Avversità	Epoca d'impiego	N° max. di trattamenti all'anno	Intervallo minimo tra i trattamenti (gg)	Dosi: l/ha (l/ha)	Volumi d'acqua (l/ha)
<b>Pomacee (melo e pero e cotogno)</b>	Cancri rameali ( <i>Nectria galligena</i> , <i>Sphaeropsis malorum</i> , <i>Phomopsis malii</i> ), Ticchiolatura ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> ) Muffa a circoli ( <i>Monilia fructigena</i> ), Colpo di fuoco batterico del pero ( <i>Erwinia amylovora</i> )	Trattamenti al bruno  Dall'ingrossamento delle gemme alla comparsa dei mazzetti fiorali	3 - 4  2 - 3	7 - 8  7 - 8	5.16 - 6.45 (0.43)  3.3 - 5,25 (0.28-0,35)	1200 - 1500  1200 - 1500
<b>Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino)</b>	Bolla ( <i>Taphrina deformans</i> ), Cancro rameale ( <i>Fusicoccum amygdali</i> ), Corineo ( <i>Stigmina carpophila</i> = <i>Coryneum beijerinckii</i> ), Moniliosi ( <i>Monilia laxa</i> , <i>M. fructigena</i> ), Nerume o Cladosporiosi ( <i>Cladosporium carpophilum</i> ), Cilindrosporiosi del ciliegio ( <i>Cylindrosporium padi</i> ), Scopazzi del ciliegio ( <i>Taphrina cerasi</i> ), Bozzacchioni del susino ( <i>Taphrina pruni</i> ). <i>Xanthomonas spp</i> , <i>Pseudomonas spp</i> (azione collaterale)	Trattamenti al bruno	3 - 4	14 - 21	4 - 6 (0.4 - 0.5)	1000 - 1200
<b>Nespolo</b>	Ticchiolatura ( <i>Fusicladium eriobotryae</i> )	Trattamenti al bruno	2 - 3	7 - 8	2,73 - 3,3 (0,27)	1000 - 1200
<b>Vite</b>	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ) ed escoriosi ( <i>Phomopsis viticola</i> ) Black-rot ( <i>Guignardia biwelli</i> )	Terza foglia distesa fino a pre-fioritura  Chiusura del grappolo fino a inizio invaiatura	3 - 5	7 - 8	2.5 - 3.5 (0.25 - 0.35)	1000
<b>Olivo</b>	Occhio di pavone ( <i>Spilocaea oleaginea</i> ), Fumaggine ( <i>Capnodium spp.</i> ), Rogna ( <i>Pseudomonas syringae</i> subsp. <i>savastanoi</i> ),	Da stasi a ripresa vegetativa  Da inizio maturazione drupe a raccolta	3 - 4	7 - 8	4 - 4.5 (0.4 - 0.45)	1000
<b>Agrumi</b>	<i>Phytophthora spp.</i> e fumaggine ( <i>Capnodium spp.</i> )	Pre-fioritura (dalla schiusura delle gemme fiorali)	3 - 4	7 - 8	2.5 - 3 (0.25 - 0.3)	1000
<b>Actinidia</b>	Marciume del colletto ( <i>Phytophthora spp.</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria alternata</i> ), Maculatura batterica ( <i>Pseudomonas viridiflava</i> ), Cancro batterico ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv, <i>actinidiae</i> )	Da dormienza fino a ripresa vegetativa	1 - 3	7 - 14	6 - 6,5 (0.6 - 0.65)	1000
<b>Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo,</b>	Mal dello stacco ( <i>Cytospora Corylicola</i> ), antracnosi del noce, Fersa del castagno	Trattamenti al bruno	2 - 3	7 - 8	2.5 - 3.45 (0.25 - 0.345)	1000

<b>Castagno, Mandorlo</b>	( <i>Mycosphaerella maculiformis</i> ). Attività collaterale contro: Macchie nere del noce ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i> ), Necrosi batterica del nocciolo ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i> ), Cancro batterico del nocciolo ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i> )					
<b>Fruttiferi minori (piccoli frutti) (in campo)</b>	Micosferella ( <i>Mycosphaerella rubi</i> ) e cancri corticali ( <i>Phomopsis cinerescens</i> )	Da dormienza fino a ripresa vegetativa	2 - 3	7 - 14	2.4 - 3.5 (0.3 - 0.35)	800 - 1000
<b>Fragola (in campo)</b>	Vaiolatura ( <i>Mycosphaerella fragariae</i> ), <i>Phytophthora spp.</i> e <i>Xanthomonas spp.</i> (azione collaterale)	Al trapianto	3 - 4	7 - 8	2 - 2.5 (0.2 - 0.25)	1000
<b>Pomodoro (in pieno campo ed in serra)</b>	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Marciume zonato ( <i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> ) e <i>Alternaria spp.</i> Attività collaterale su batteriosi		3 - 4	7 - 8	2.5 - 3.5 (0.25 - 0.35)	1000
<b>Melanzana (in pieno campo ed in serra)</b>	Cancrena pedale ( <i>Phytophthora spp.</i> ), antracnosi ( <i>Colletotrichum coccodes</i> ). Attività collaterale su batteriosi.		2 - 3	7 - 8	2.5 - 3 (0.25 - 0.3)	1000
<b>Cucurbitacee a buccia commestibile (in pieno campo ed in serra)</b>	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> , <i>Colletotrichum lagenarium</i> , Maculatura angolare ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> ). .	In vegetazione	2 - 3	7 - 8	2 - 3 (0.25 - 0.3)	800 - 1000
<b>Cucurbitacee a buccia non commestibile (in campo)</b>	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> , <i>Colletotrichum lagenarium</i> . Maculatura angolare ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> ).		2 - 3	7 - 8	2 - 3 (0.25 - 0.3)	800 - 1000
<b>Ortaggi a stelo in campo: carciofo, asparago (intervenire dopo la raccolta dei turioni)</b>	<i>Peronospora (Bremia lactucae)</i> , Antracnosi ( <i>Ascochyta spp.</i> ) batteriosi (attività collaterale), <i>Septoria apiicola</i> ,		3 - 4	7 - 8	1.5 - 3 (0.25 - 0.3)	600 - 1000
<b>Legumi (Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia) (in campo e serra)</b> <b>Ortaggi a bulbo e cavoli a infiorescenza (in campo)</b>	Peronospora ( <i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora schleideni</i> , <i>Peronospora pisi</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora spp.</i> ), <i>Alternaria spp.</i> , antracnosi ( <i>Ascochyta spp.</i> <i>Colletotrichum spp.</i> ) batteriosi (attività collaterale),		2 - 3	7 - 8	1.5 - 3 (0.25 - 0.3)	600 - 1000
<b>Patata (in campo)</b>	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ) e <i>Alternaria spp.</i> Attività collaterale su		3 - 4	7 - 8	3 - 4 (0.3-0.4)	1000

	Batteriosi.					
<b>Cipresso</b>	Cancro del cipresso ( <i>Coryneum=Seiridium cardinalis</i> )		2 - 3	7 - 8	2.8 - 3.5 ( 0,35)	800 - 1000
<b>Colture floreali ( in campo e serra )</b>	Peronospora, Alternariosi. Attività collaterale su Batteriosi. <i>Diplocarpon rosae</i>	Alla comparsa delle condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno	2 - 3	7 - 8	1.35 - 2.25 ( 0.23)	600 - 1000

#### **COMPATIBILITÀ'**

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

**FITOTOSSICITA':** non trattare durante la fioritura.

Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floricolore e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala. Favorita di Clapp, Kaiser.

#### **INTERVALLO DI SICUREZZA:**

Sospendere i trattamenti **3** giorni prima della raccolta per carciofo, melanzana, legumi, ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia commestibile;

**3** giorni per pomodoro da mensa;

**7** giorni per fragola, patata, cucurbitacee a buccia non commestibile;

**10** giorni per pomodoro da industria;

**14** giorni per cavoli, olivo;

**21** giorni prima della raccolta per vite.

#### **ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
(ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

# CUTRIL TOP

**Fungicida a base di Rame sotto forma di rame solfato tribasico**  
**Sospensione concentrata**  
**Gruppo FRAC: M1 Fungicida multisito con attività di contatto**



## COMPOSIZIONE

- Rame metallo g. 15,2 (= 190 g/l)  
(sotto forma di rame solfato tribasico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

**ATTENZIONE**

**Indicazioni di pericolo:** H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**Consigli di Prudenza:** P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. P391 raccogliere il materiale fuoruscito. P501 smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle normative vigenti.

**Informazioni supplementari:** EUH401 per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### **Titolare dell'autorizzazione:**

GOWAN ITALIA S.r.l. – Via della Costituzione nr. 8 – 48018 Faenza (RA) - Tel. + 39 0546 629911

### **Stabilimento di produzione e/o confezionamento:**

Isagro Spa - Località Colafonda 5 - 45010 Cavanella Po – Adria (RO)

### **Stabilimenti di solo confezionamento:**

Isagro S.p.A. – Via Nettunense Km 23,400 – 04011 Aprilia (Latina)

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. – Via E. Torricelli nr. 2 – 48033 Cotignola (RA)

Diachem S.p.A. – U.P. SIFA Caravaggio – (BG)

### **Stabilimento di rietichettatura:**

Arco Logistica S.r.l. Via Battistella, 22 44123 Ferrara

Arco Logistica S.r.l. Via Monari, 5 - 44124 Ferrara

### **Distribuito da:**

SERBIOS s.r.l. – Via E. Fermi nr. 112 - Badia Polesine (RO) – Tel.: 0425 590622

Contenuto netto: ml 100

**Partita n.:**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 Giugno 2025*