

ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S - Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. 13206 del 26/05/2009

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro

g. 95

Coformulanti q.b.a

g. 100

RAVEN ZOLFI di La Mendola & C. Srl

sede legale: Via Scalo FF.SS. Campobello-Ravanusa - 92023 Campobello di Licata (AG)

sede amministrativa: Contrada Sciabani (Agro di Naro) - SS. 123 Km. 6,100

92023 Campobello di Licata (AG)

Tel. 0922877299

Contenuto:
kg 5-10-25

Partita n°

Stabilimento di produzione:

Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l. - V Strada n. 15 - Zona Industriale - 95121 Catania

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti e indumenti protettivi

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le operazioni di carico e miscelazione del prodotto e di applicazione manuale è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro, guanti protettivi e protezioni respiratorie. Durante le operazioni di mantenimento successive al trattamento è raccomandato l'uso di indumenti da lavoro e guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

• una fascia di sicurezza non trattata di 5m dai corpi idrici superficiali per l'uso su vite e ortaggi a frutto;

• una fascia di sicurezza non trattata di 20m oppure una fascia vegetata non trattata di 10m dai corpi idrici superficiali per l'uso su pomacee e drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20m dalla zona non coltivata.

Per applicazioni su vite, pomacee e drupacee: Pericoloso per le api. Non applicare al momento della fioritura. Non applicare se sono presenti piante spontanee in fioritura; in alternativa, sfalcare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di intossicazione chiamare il medico o un CENTRO ANTIVELENI per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole.

Il prodotto controlla anche gli acari eriofidi della vite (erinosi e acariosi), eriofide del nocciolo, eriofide rugginoso del pomodoro, ticchialatura delle pomacee, ruggine delle drupacee.

Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

CAMPO D'IMPIEGO: Vite da tavola e da vino, Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio e susino), Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo), Mandorlo, Nocciolo, Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cucurbitacee a buccia edule e non edule), in pieno campo e coltura protetta.

DOSI D'IMPIEGO

Vite: 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53 (grappoli visibili) e le successive da BBCH 71 (allegagione).

Pomacee (melo, pero, cotogno): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° e la 3° da BBCH 53-59 (comparsa dei mazzetti fiorali-prefioritura), le successive da BBCH 71 (allegagione)

Drupacee (pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): 25 kg/ha, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5 giorni: la 1° applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), la 2° a BBCH 69 (caduta petali), le successive da BBCH 71 (allegagione).

Nocciolo: 25 kg/ha, effettuare al massimo 4 applicazioni per anno contro Eriofide e 6 applicazioni anno contro Oidio, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la 1° e la 2° applicazione a BBCH 13-14 (3-4 foglie distese) e le successive dalla apertura delle gemme; contro oidio da BBCH 71-75 (allegagione-ingrossamento nocula).

Ortaggi a frutto (solanacee e cucurbitacee): 25 kg/ha contro oidio e eriofide rugginoso del pomodoro, effettuare al massimo 8 applicazioni per anno, con un intervallo minimo di 5-7 giorni: la prima applicazione a BBCH 15 (5 foglie distese), le successive da BBCH 53 (3° infiorescenza visibile).

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione variabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, ripetendoli ad intervalli di 5-7 giorni, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore più fresche della giornata. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

GESTIONE DELLA RESISTENZA. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto, pur essendo compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca, si impiega da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranche, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO