

# LUQSOL PREMIUM BLUE

INSETTICIDA ED ACARICIDA (CONCENTRATO EMULSIONABILE)

## LUQSOL PREMIUM BLUE

### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:  
Olio minerale paraffinico (N. CAS 8042-47-5) g 97 (= 830 g/L)  
Coformulanti q.b. a g 100

### Indicazioni di Pericolo

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di Prudenza** P261 Evitare di respirare gli aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

**Titolare dell'autorizzazione:** LERIDA UNION QUIMICA S.A., C./Afores s/n, 25173 Sudanel Lleida (Spagna)  
Tel. [0034] 973 25 82 56

**Distribuito da:** UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

**Officine di produzione e/o confezionamento:** LERIDA UNION QUIMICA S.A., C./Afores s/n, 25173 Sudanel Lleida (Spagna)

**Stabilimento di rietichettatura:** ARCO Logistica Srl – Ferrara (FE); CDM Srl - Cimadolmo (TV)

**Registrazione del Ministero della Salute N. 19346 del 30.06.2026**

**Contenuto netto: 100, 250, 500 mL / 1,5,10, 20, 25 L**

**Partita N...**



**ATTENZIONE**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Protezione dell'operatore:

- durante miscelazione/caricamento del prodotto: indossare indumenti da lavoro e guanti.
- durante l'applicazione, se effettuata manualmente indossare indumenti da lavoro e guanti; se effettuata mediante trattrice, indossare indumenti da lavoro.
- durante le attività di rientro in campo, indossare indumenti idonei a coprire gli arti superiori e inferiori.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

- 15 m per applicazioni su mandorlo, drupacee, pomacee, nocciolo, cachi, castagno, melograno, kiwi, mango, noce e noce pecan.
- 20 m per applicazioni su agrumi, avocado e kumquat.
- 30 m per applicazioni su banano.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, per l'uso su banano, rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zone non coltivate pari a 5 m.

**INFORMAZIONI MEDICHE:** In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente un medico.  
Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi fogliari siano completamente asciutti.

## CARATTERISTICHE

LUQSOL PREMIUM BLUE è un insetticida di contatto a base di olio minerale paraffinico altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce la respirazione causando quindi la morte per asfissia del fitofago.

## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

**Drupacee, Pomacee, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Noce pecan, Castagno, Cachi, Kiwi, Melograno, Mango**

Contro Acari, Cocciniglie farinose (*Pseudococcidae*), Cocciniglie (*Coccidae*), Afidi (*Aphididae*): 0,75-1 L/hl (6-15 L/ha) distribuiti con volume massimo di irrorazione di 1500 L/ha. Effettuare un solo trattamento per anno, all'insorgenza delle prime infestazioni parassitarie, fino alla fioritura.

### Agrumi, Kumquat e Avocado

Contro Cocciniglie farinose (*Pseudococcidae*), Cocciniglie (*Coccidae*), Afidi (*Aphididae*), Mosche Bianche (*Aleyrodidae*): 1-1,5 L/hl (15-45 L/ha) con volume massimo di irrorazione di 3000 L/ha. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno all'insorgenza delle prime infestazioni parassitarie, prima della fase di invaiatura. Rispettare tra i trattamenti un intervallo di almeno 10 giorni.

### Banano

Contro Cocciniglie farinose (*Pseudococcidae*), Cocciniglie (*Coccidae*), Afidi (*Aphididae*), Mosche Bianche (*Aleyrodidae*): 1-1,5 L/hl (15-45 L/ha) distribuiti con volume massimo di irrorazione di 3000 L/ha. Effettuare massimo un solo trattamento/anno all'insorgenza delle prime infestazioni parassitarie, lungo l'intero ciclo vegetativo.

Le dosi sopra riportate espresse in L/hL si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione. In caso di Volumi Ridotti, fare riferimento alla dose ad ettaro. Per massimizzare l'attività del formulato, impiegare volumi di irrorazione adeguati a garantire una sufficiente bagnatura delle piante trattate. In ogni caso, al fine di ottenere un'adeguata efficacia del trattamento, verificare che l'applicazione consenta la completa ricopertura degli insetti ed acari bersaglio.

**Preparazione della miscela:** versare il prodotto nel serbatoio già riempito per 3/4 di acqua, mantenendo la pompa in costante agitazione, quindi portare l'acqua al volume totale. Durante l'impiego mantenere la miscela in costante agitazione.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto non è compatibile con fungicidi quali captano, folpet o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Non trattare durante la fioritura. Si possono avere rischi di fitotossicità in caso di trattamenti durante periodi prolungati con temperature elevate. Non trattare piante sotto stress idrico.

## ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente -**