

MECCANISMO D'AZIONE: CODICE FRAC M01 (rame), M02 (zolfo)

Rame metallo (da rame solfato tribasico)	g 5,4 (80 g/L)
Zolfo puro (esente da Selenio)	g 43,2 (640 g/L)
Coformulanti q.b. a	q 100



- su frumento, segale, triticale e farro rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 1 metro da aree non coltivate utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%;

Coltura	Avversità	Dose (L/ha)	Dose (L/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
VITE DA VINO E DA TAVOLA	<u>Peronospora</u> (<i>Plasmopara viticola</i>); <u>Oidio</u> (<i>Erysiphe necator</i>); <u>Marciume nero o Black-Rot</u> (<i>Guignardia bidwellii</i> - sin. <i>Phyllosticta ampellicida</i>)	4 - 10	0,4 - 1	Intervallo minimo: 5 giorni Numero massimo di applicazioni: 18	7
OLIVO	<u>Occhio di pavone</u> (<i>Spilocaea oleaginea</i> , <i>Venturia oleaginea</i>); <u>Lebbra o Antracnosi</u> (<i>Gloeosporium olivarum</i> , <i>Colletotrichum</i> spp.); <u>Batteriosi o Rogna</u> (<i>Pseudomonas savastanoi</i>); <u>Piombatura o Cercosporiosi</u> (<i>Pseudocercospora cladosporioides</i>)	4 - 10	0,3 - 1	Intervallo minimo: 7 giorni Numero massimo di applicazioni: 15	14
FRUTTA A GUSCIO Nocciolo, mandorlo, noce, castagno, pistacchio	<u>Antracnosi</u> (<i>Colletotrichum</i> spp., <i>Gnomonia juglandis</i>); <u>Batteriosi</u> (<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Xanthomonas</i> spp.); <u>Mal dello stacco</u> (<i>Cytospora corylicola</i>); <u>Macchia rossa</u> (<i>Polystigma</i> spp.); <u>Bolla</u> (<i>Taphrina deformans</i>)	4 - 10	0,4 - 1,5	Intervallo minimo: 7 giorni Numero massimo di applicazioni: 3	14
POMODORO (pieno campo)	<u>Peronospora</u> (<i>Phytophthora infestans</i>), <u>Alternariosi</u> (<i>Alternaria</i> spp.), <u>Oidio</u> (<i>Oidium neolycopersici</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe</i> spp.) <u>Batteriosi</u> (<i>Pseudomonas</i> spp.; <i>Xanthomonas</i> spp)	4 - 10	0,4 - 1	Intervallo minimo: 5 giorni Numero massimo di applicazioni: 18	3
BIETOLE (pieno campo) Barbabietole da zucchero e da foraggio, bietola rossa e dorata.	<u>Oidio</u> (<i>Erysiphe betae</i>), <u>Cercospora</u> (<i>Cercospora beticola</i>)	5,5 - 10	-	Intervallo minimo: 5 giorni Numero massimo di applicazioni: 6	14

Coltura	Avversità	Dose (L/ha)	Dose (L/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
rapa, sedano rapa, rafano					
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, FARRO	<u>Septoriosi</u> (Septoria spp.)	5 - 8	-	Applicare YESTON Ultra prima della fioritura (BBCH 30-61). Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo minimo: 7 giorni.	35

Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; olivo: 1500 L/ha, orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare le dosi ad ettaro. Per l'impiego con irroratrici a recupero di volume o nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in litri per ettolitro (L/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

UTILIZZO DEL PRODOTTO: agitare la confezione prima dell'uso, versare YESTON ULTRA® direttamente nella botte riempita per $\frac{3}{4}$ con acqua mantenendo l'agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l'agitatore.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc...), olii minerali, captano e prodotti contenenti solventi organici. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: YESTON ULTRA® è un prodotto fitosanitario ad azione multisito (rame M01, zolfo M02). Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

FITOTOSSICITÀ: si consiglia di non trattare durante la fioritura. Non trattare con pianta bagnata (es. rugiada) o con temperature molto elevate. Per evitare problemi di scottature solari (sun burn) prestare attenzione alle giornate limpide e particolarmente soleggiate. Limitare i volumi di bagnatura per evitare gocciolamenti e depositi. Visto il rapido evolversi di nuove varietà si consiglia di effettuare sempre una prova di saggio su una porzione limitata di campo prima dell'impiego.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all'intervallo di sicurezza riportato in tabella.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto

di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Coltura	Avversità	Dose (L/ha)	Dose (L/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
rapa, sedano rapa, rafano					
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, FARRO	<u>Septoriosi</u> (Septoria spp.)	5 - 8	-	Applicare YESTON Ultra prima della fioritura (BBCH 30-61). Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo minimo: 7 giorni.	35

Le dosi sopra riportate si riferiscono all'utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; olivo: 1500 L/ha, orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare le dosi ad ettaro. Per l'impiego con irroratrici a recupero di volume o nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in litri per ettolitro (L/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

UTILIZZO DEL PRODOTTO: agitare la confezione prima dell'uso, versare YESTON ULTRA® direttamente nella botte riempita per $\frac{3}{4}$ con acqua mantenendo l'agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l'agitatore.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc...), olii minerali, captano e prodotti contenenti solventi organici. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: YESTON ULTRA® è un prodotto fitosanitario ad azione multisito (rame M01, zolfo M02). Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

FITOTOSSICITÀ: si consiglia di non trattare durante la fioritura. Non trattare con pianta bagnata (es. rugiada) o con temperature molto elevate. Per evitare problemi di scottature solari (sun burn) prestare attenzione alle giornate limpide e particolarmente soleggiate. Limitare i volumi di bagnatura per evitare gocciolamenti e depositi. Visto il rapido evolversi di nuove varietà si consiglia di effettuare sempre una prova di saggio su una porzione limitata di campo prima dell'impiego.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all'intervallo di sicurezza riportato in tabella.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto

di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**